



Mark W. Mitchell, D.D.S. Uday Mehta, D.M.D., M.D. Shaun R. Young, D.M.D. Samuel Landrian, D.M.D., M.D.

INSTRUCCIONES QUIRURGICAS PARA DESPUES DE LA CIRUGIA

Informacion adicional: Estas instrucciones son para el uso general y es posible que no sean específicas para su pertinente cirugía y necesidad. Para información específica por favor de hablar con su cirujano y asistente. Siempre estamos dispuestos a ayudarle.

1. **Las MEDICINAS/las PRESCRIPCIONES:** Si un antibiótico se prescribe, deberá ser tomado hasta que se haya terminado. La medicina del dolor deberá ser tomada como instruido en la botella. No impulsor cuándo tomar narcótico la medicina del dolor. El anestésico local ilevará lejos dentro de ½ una hora a 4 horas despues de la cirugía. Es importante tomar su medicina del dolor antes que el dolor empieze.. Es también importante comer antes de tomar la medicina. No comer puede causar náusea y vomito.. Si usted desarrolla sarpullido, picazon, dificultad al respirar, resollando, congestión nasal o hinchándose alrededor de los ojos, por favor de parar de tomar todas medicinas y notificar a nuestra oficina inmediatamente. La ATENCION: todos pacientes femeninos píldoras de control de la natalidad que utilizan, sean avisadas por favor que si el doctor prescribe el uso de antibióticos, una forma alternativa del control de la natalidad se debe utilizar durante ese período de tiempo.
2. **SANGRIENTO:** Gasa se colocó sobre el sitio quirúrgico para que sirviera como una venda de presión cuando usted muerde hacia abajo. Generalmente, recomendamos la partidalo en lugar hasta que el entumecimiento de los uso anestésicos locales lejos y oozing vigoroso no ocurra cuando la gasa se quita. Reemplace la gasa para controlar por hora sangriento si necesario. Quite la gasa cuando las medicinas van a ser tomadas. Una cantidad pequeña de oozing es normal. Usted puede desear cubrir su almohada con una toalla para evitar manchar. Descanse con cabeza elevada en 2 o más almohadas para el primer día. Excesivo sangriento puede ser controlado colocando una bolsa humedecida de té sobre el sitio quirúrgico por una hora mientras aplicando la presión.
3. **COMER:** Recomendamos alimentos suaves para las primeras 24 horas. Las sugerencias son: helado, Gelatina, pudines, el yogurt, queso de casita, batidos, la salsa de manzanas. Para los próximos 4 días, siga una dieta suave (los huevos, papas trituradas, las pastas). Beba más líquidos que usted hace generalmente. Ninguna bebidas del alcoholico ni carbonated por 4 días después de la cirugía. Esto no es el tiempo de perder el peso; nutrición apropiada es necesaria para curar.
4. **HINCHANDOSE:** Algunos pacientes se hinchán después de la cirugía, esto es normal; no se alarme. Lleva 3 días para que el area quirugica se hinche e alcance un pico antes de bajar. Las bolsas del hielo se usan para reducir hinchazon y produce un entumecimiento local inmediatamente después de la cirugía. Las bolsas del hielo se deben aplicar durante las primeras 24 horas después de la cirugía.
5. **EL FUMAR:** Nosotros recomendamos no fumar de el todo durante las primeras 72 horas después de la cirugía. El fumar puede aumentar el dolor y a la curación pobre. Lo más largo que usted refrena del fumar, menos posibilidad tiene de problemas de postoperative.
6. **La ACTIVIDAD:** Evita el esfuerzo y la fatiga físicos excesivos durante el período inmediato de postoperative. Obtenga el sueño adecuado.
7. **CEPILLAR de DIENTE:** Ningún CEPILLAR EL DIA DE la CIRUGIA. Cepillar del sitio quirúrgico inmediato se debe discontinuar para acerca de 1 semana después que la cirugía para prevenir interrupción del coágulo de sangre, los tejidos y/o las suturas curativos. El resto de la boca se puede cepillar normalmente. Cuándo usted resume cepillar en el sitio quirúrgico usted puede experimentar una cantidad pequeña de sangriento o la molestia, pero esto son normales.
8. **Las SUTURAS/VESTIDOS:** Una variedad de suturas y vestidos se puede haber usado como parte de su tratamiento y usted los pueden sentirse con su lengua. Ellos hacen o se disuelve en su propio o es quitado en la cita apropiada de postoperative.

6731 Madison Street, New Port Richey, FL 34652 (727) 842-5180 Fax: (727) 846-0755

2535 Landmark Drive – Suite 105, Clearwater, FL 33761 (727) 791-6529 Fax: (727) 796-6529

12546 Racetrack Road, Tampa, FL 33626 (813) 749-0930 Fax (813)749-0812

INSTRUCCIONES DE ANESTESIA INTRAVENOSA

Las efectos mayores de las drogas intravenosas habrán llevado lejos antes usted es permitido salir nuestra oficina. Sin embargo, puede haber los efectos residuales que duran 6-12 horas y a veces más largo. Durante este tiempo, su tiempo del reflejo y el juicio se pueden alterar. Por lo tanto, usted es avisado a no manejar una maquinaria de automóvil ni operar durante el día del anestésico ni mientras las medicinas del dolor de narcótico que toman. Durante ese mismo período débalo experimenta lightheadedness, el mareo, etc., no procura caminar sin ayuda.

LAS INSTRUCCIONES INMEDIATAS DE DENTADURA

La dentadura que se colocó en la boca inmediatamente después que la cirugía servirá como una venda quirúrgica. Salga la dentadura en el lugar por 24 horas. Si la dentadura se quita demasiado temprana, los tejidos orales pueden continuar hincharse, y usted no será capaz de reemplazar la dentadura. Después que 24 horas, quitan necesitó como limpiar o aclarar la boca. Después que el inicial 24 período de hora, es importante mantener la dentadura fuera de noche para tener en cuenta la curación adecuada.

CONDICIONES POSIBLES DESPUES DE CIRUGIA

Uno o más de las condiciones siguientes pueden desarrollar después su cirugía. Si ése es el caso, se refiere por favor a esta hoja. Llame nuestra oficina si usted tiene las preguntas adicionales.

1. **ANTIBIOTICOS:** Puede causar el contratiempo de diarrea o estómago. Comer el yogur activo de cultura puede ayudar la disminución la incidencia restaurando flora gastrointestinal normal.
2. **FIEBRE:** La temperatura oral, mediana y normal es 98.6 Fahrenheit. Su temperatura puede subir levemente por un día o dos después que la cirugía y es generalmente de no concierne. Si usted se siente entibiar o suderoso, recomendamos que usted tome y registre su temperatura oral durante la mañana y antes de jubilar. Una temperatura persistentemente levantada debe ser informada a nuestra oficina. Beba la abundancia de líquidos durante este período, pero no dentro delos pocos minutos antes de tomar su temperatura.
3. **EI ENCHUFE SECO:** Esto puede ocurrir 3-5 días después de la cirugía, generalmente con bajar terceras muelas (dientes de sabiduría). Es caracterizado generalmente por un dolor a semejanza de dolor de oídos que late y un sabor y el olor asquerosos como el resultado de la pérdida del coágulo de sangre en el enchufe de diente. El tratamiento es sencillo, la irrigación que implica y la colocación que viste para aliviar la molestia.
4. **RIGIDEZ de MUSCULO:** la Ternura y rigidez dentro de los músculos que mascan puede desarrollar durante el período de postoperative y no lo debe alarmar. Es generalmente debido a hincharse en el área de los músculos y mejor es tratado con la terapia húmeda del calor. Resolverá lentamente sobre un 5 a 10 período del día.
5. **EI SITIO de la INYECCION de IV:** El punto donde la aguja entró la vena puede desarrollar un color azulado que cambiará a amarillo y entonces a normal en una cuestión de días. Puede haber una ternura leve al área y quizás pequeño amontona. Estos signos y los síntomas son generalmente de no concierne y mejor son tratados con una toalla y la elevación calientes y húmedas del brazo. Deba el brazo comienza a hincharse o el progreso de la ternura arriba hacia el hombro, llama por favor nuestra oficina.
6. **La NAUSEA/VOMITAR:** la Náusea la cirugía que sigue es generalmente debido a tomar las medicinas en un estómago vacío. Siga comiendo y tome como pocas píldoras de dolor como posible. La planicie que beborrotea 7-Arriba, la gaseosa de jengibre, o la cola pueden ayudar. Llame nuestra oficina si la náusea o vomitar severos persisten.
7. **EI ENTUMECIMIENTO:** Como explicamos antes de cirugía, un entumecimiento parcial de labio o lengua puede ser aparente cuando la anestesia local lleva lejos. El tiempo resolverá generalmente esta condición. Podría ser varias semanas a varios meses antes de sentir los regresos. Vuelve lentamente y es duro para usted percibir el cambio. Las sensaciones de "quemar", "sentir hormigueo", o los "golpes eléctricos" en las áreas entumecidas indican ese sentir vuelve. Llame cualquier entumecimiento a nuestra atención en su primera visita de postoperative.
8. **Las ORILLAS HUESUDAS AGUDAS:** Los pedazos pequeños de hueso pueden solucionar del área quirúrgica tan largo como 5 a 6 semanas después de la cirugía. Esto puede resolver por sí mismo sobre un período de unos pocas semanas. Si necesario, la eliminación de spicules de hueso es un proceso sencillo y rutinario.
9. **EI LABIO ADOLORIDO/MEJILLAS:** Los rincones de la boca pueden ser secos y agrietados después de la cirugía. Esto es tratado mejor por aplicar suavemente Vaselina.